



Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
di Area Metropolitana di Bologna – SIMT A.M.BO
Direttore: Dr. ssa Vanda Randi



Gentilissimi,

in relazione alla distribuzione, su tutto il territorio Nazionale, del vaccino Johnson & Johnson, nel ricordare che la sospensione post vaccinale varia, in ottemperanza alle vigenti normative Nazionali ed Europee, in relazione al tipo di vaccino cui si è stati sottoposti, si indicano, di seguito, i relativi periodi di sospensione:

Azienda	Composizione	Sospensione
Pfizer Biontech	Utilizza la tecnologia dell'RNA messaggero. STIMOLA le cellule a produrre una proteina che aiuterà a creare anticorpi per prevenire ulteriori infezioni	Almeno tre giorni da ciascun episodio vaccinale
Moderna	Utilizza la tecnologia dell'RNA messaggero. STIMOLA le cellule a produrre una proteina che aiuterà a creare anticorpi per prevenire ulteriori infezioni	Almeno tre giorni da ciascun episodio vaccinale
Astra Zeneca	Versione attenuata del virus del raffreddore comune dello scimpanzé, noto anche come adenovirus. Utilizza quella parte della superficie del coronavirus, in grado di stimolare la risposta immunitaria.	Almeno tre giorni da ciascun episodio vaccinale
Johnson & Johnson	Vaccino a vettore virale e si basa su un virus sostanzialmente innocuo per l'organismo umano (adenovirus umano tipo 26). Una volta somministrato con la vaccinazione, l'adenovirus modificato penetra nel nucleo delle cellule dove fornisce il codice genetico per produrre la proteina Spike di SARS –CoV-2. Le cellule T del sistema immunitario riconoscono lo stimolo della proteina Spike ed attivano la risposta immunitaria e la produzione di anticorpi specifici contro il virus.	Almeno tre giorni da ciascun episodio vaccinale

Si raccomanda, inoltre di osservare le specifiche raccomandazioni di seguito riportate:

- Esibire, in occasione della donazione, il certificato vaccinale in cui è indicato il tipo di vaccino cui si è stati sottoposti
- In via precauzionale, qualora dopo la somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2, si sviluppasse sintomi, per essere accettati alla donazione di sangue e/o plasma è necessario che trascorrono almeno sette giorni dalla completa risoluzione dei sintomi stessi.
- Se è stato somministrato un vaccino anti-SARS-CoV-2 di cui manchino o non si riescano a reperire sufficienti informazioni, si è idonei alla donazione di sangue e/o plasma dopo almeno quattro settimane da ciascun episodio vaccinale.

Azienda USL di Bologna
Dr.ssa Vanda Randi
Direttore
Servizio di Immunoematologia
e Medicina Trasfusionale
Area Metropolitana di Bologna